NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/08/2018

Dénomination du médicament

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant dutiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?
3. Comment utiliser HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?
6. Contenu de lemballage et autres informations.

1. QUEST-CE QUE HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique.

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé chez ladulte et lenfant à partir dun an, en cas dirritation ou de gêne oculaire dorigines diverses (effort visuel soutenu, bain de mer ou de piscine, fatigue oculaire, atmosphère enfumée, etc).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DUTILISER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Nutilisez jamais HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose :

· si vous êtes allergique aux substances actives ou à lun des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· chez les enfants de moins dun an.

Avertissements et précautions

· lorsque lirritation saccompagne de pus (paupières collées le matin au réveil) ou en cas de douleur vive, de choc direct ou de blessure : consultez alors rapidement un médecin.

· A réserver aux affections mineures, si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours, consultez un médecin.

· Le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement.

· Pendant lapplication, évitez tout contact du bout du contenant avec le globe oculaire ou les cils.

Enfants

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 1 an.

Autres médicaments et HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose avec des aliments, boissons et de lalcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose peut être utilisé pendant la grossesse et lallaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose habituelle est 1 à 2 gouttes dans chaque il, 2 à 6 fois par jour.

Cessez le traitement dès la disparition des symptômes.

Mode dadministration

Voie ophtalmique.

1. Ouvrir le sachet aluminium.

2. Détacher un flacon unidose de la barette.

3. Ouvrir lunidose en tournant lembout.

4. Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et lil (dans le cul-de-sac conjonctival), en pressant légèrement lunidose.

5. Fermer soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin dinstiller une solution toujours stérile, utilisez une nouvelle unidose lors de chaque application.

Si vous avez limpression que leffet dHOMEOPTIC, collyre en récipient unidose est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Utilisation chez les enfants

Sans objet.

Si vous avez utilisé plus de HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose que vous nauriez dû

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez dutiliser HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez dutiliser HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Nutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à labri de la chaleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-légout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien déliminer les médicaments que vous nutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lenvironnement.

6. CONTENU DE LEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose

· Les substances actives sont :

Euphrasia officinalis 3 DH..... 0,004 g

Calendula officinalis 3 DH..... 0,001 g

Magnesia carbonica 5 CH..... 0,001 g

Pour une dose de 0,4 ml

· Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, eau purifiée.

Quest-ce que HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose et contenu de lemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de collyre en récipient unidose sans conservateur. La boîte contient 2 ou 4 sachets de 5 unidoses.

Titulaire de lautorisation de mise sur le marché

Boiron

2 AVENUE DE LOUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

France

Exploitant de lautorisation de mise sur le marché

Boiron

2 AVENUE DE LOUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

France

Fabricant

BOIRON

ZAC DES FRENES

1 RUE EDOUARD BUFFARD

77144 MONTEVRAIN

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

à compléter ultérieurement par le titulaire

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lANSM (France).