NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 23/04/2026

Dénomination du médicament

CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent

Bromo-galactogluconate de calcium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?
3. Comment prendre CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?
6. Contenu de lemballage et autres informations.

1. QUEST-CE QUE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : HYPNOTIQUE ET SEDATIF (N : Système Nerveux Central).

Ce médicament est préconisé dans les troubles légers du sommeil, irritabilité, nervosité.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

Si votre médecin vous a informé(e) dune intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent dans les cas suivants :

· Acné juvénile.

· Enfant de moins de 30 kg.

· Sujet âgé dénutri et/ou déshydraté.

· Hypercalcémie, (quantité excessive de calcium dans le sang).

· Lithiase calcique (calcul de calcium).

· Hypercalciurie (quantité excessive de calcium dans les urines).

· Calcifications (dépôts de calcium) dans les reins.

· Néphropathie glomérulaire chronique (maladie des reins).

· En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas dintolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par lincapacité à décomposer le fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent.

Mises en garde spéciales

En cas de survenue de trouble neuropsychique (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?), de rougeur ou démangeaisons de la peau, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Précautions demploi

· Labsorption dalcool est fortement déconseillée pendant le traitement.

· Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 241 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

· Ce médicament contient 2,86 g de saccharose par comprimé effervescent dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucres ou de diabète.

· Une interférence est possible avec le dosage des chlorures dans le sang.

En cas de doute ne pas hésiter à demander lavis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Réservé à ladulte et à lenfant de plus de 30 kg.

Autres médicaments et CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent avec des aliments, boissons et de lalcool

Labsorption dalcool est fortement déconseillée pendant le traitement

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Lutilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La conduite de véhicules ou lutilisation de machine est déconseillée en raison du risque de somnolence attaché à lemploi de ce médicament.

CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent contient du sodium et du saccharose.

La dose maximale de 2 comprimés contient 481 mg de sodium (composant principal du sel de table) Cela équivaut à 24% de lapport alimentaire quotidien maximal de sodium recommandé pour un adulte. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez besoin de ce produit quotidiennement pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à faible teneur en sel (sodium).

Ce médicament contient 2,86 g de saccharose par comprimé, soit 5,72 g de saccharose pour 2 comprimés. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré. Du fait de sa contenance en saccharose, ce médicament peut être nocif pour les dents. Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservé à ladulte et à lenfant de plus de 30 kg.

Adulte : 1 à 2 comprimés effervescents par jour.

Enfant de plus de 30 kg : 1 comprimé effervescent par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière de :

· deux comprimés effervescents chez ladulte,

· un comprimé effervescent chez lenfant de plus de 30 kg.

Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription du médecin.

Mode dadministration

Voie orale.

Dissoudre le comprimé dans un demi-verre deau.

Durée de traitement

Ne pas dépasser 3 semaines de traitement.

Si vous avez pris plus de CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent que vous nauriez dû :

Prévenir un médecin en urgence.

Si vous oubliez de prendre CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent :

Prenez votre médicament à lheure habituelle. Ne doublez pas la dose.

Si vous arrêtez de prendre CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent :

Sans objet.

Si vous avez dautres questions sur lutilisation de ce médicament, demandez plus dinformations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

· Somnolence diurne, irritabilité, désorientation, confusion, hallucinations ; ces effets sobservent en particulier chez le sujet âgé et aux fortes posologies.

· Perte dappétit, constipation.

· Très rarement : atteinte cutanée (rougeur, démangeaisons).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

Tenir ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Nutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur lemballage extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-légout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien déliminer les médicaments que vous nutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lenvironnement.

6. CONTENU DE LEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent

· La substance active est :

Bromo-galactogluconate de calcium [1]..... 2,000 g

Pour un comprimé effervescent.

[1] Correspondant à 301 mg (soit 3,77 mmoles) de brome et 150,7 mg (soit 3,77 mmoles) de calcium.

· Les autres composants sont : saccharose, bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, polyéthylène glycol 4000.

Quest-ce que CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent et contenu de lemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent en boîte de 20 ou 60 comprimés effervescents.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de lautorisation de mise sur le marché

EQUILIBRE ATTITUDE

ZAC du Font de lOrme

1198, avenue du Docteur Maurice Donat

06250 MOUGINS

Exploitant de lautorisation de mise sur le marché

LABORATOIRE DES GRANIONS

Le Parador II

5 Allée Crovetto Frères

98000 Monaco

Fabricant

LABORATOIRE DES GRANIONS

Le Parador II

5 Allée Crovetto Frères

98000 Monaco

OU

DELPHARM ORLEANS

5, AVENUE DE CONCYR

45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lANSM (France).