

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 11/06/2024

Dénomination du médicament

MERCRYL, solution pour application cutanée

Chlorure de benzalkonium/Digluconate de chlorhexidine

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MERCRYL, solution pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MERCRYL, solution pour application cutanée ?
3. Comment utiliser MERCRYL, solution pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MERCRYL, solution pour application cutanée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QUEST-CE QUE MERCRYL, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTISEPTIQUE (D. Dermatologie) - D08AC52

Ce médicament est un antiseptique. Il est utilisé pour l'antisepsie et le nettoyage des petites plaies superficielles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYL, solution pour application cutanée ?

N'utilisez jamais MERCRYL, solution pour application cutanée :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles,
- Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser MERCRYL solution pour application cutanée.

- Évitez tout contact avec le cerveau, les méninges (les membranes entourant le cerveau et la moelle épinière) et l'oreille moyenne.
- MERCRYL, solution pour application cutanée ne doit pas entrer en contact avec l'il en raison du risque de lésions visuelles. Si elle entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. En cas d'irritation, de rougeur ou de douleur oculaire, ou de troubles visuels, demandez rapidement conseil à un médecin.
- Des cas graves de lésion cornéenne persistante (lésion à la surface de l'il) pouvant nécessiter une greffe cornéenne ont été rapportés lorsque des produits similaires sont accidentellement entrés en contact avec l'il au cours d'interventions chirurgicales, chez des patients sous anesthésie générale (sommeil sans

douleur intense).

Ce médicament est réservé à l'usage externe.

En cas d'utilisation sur une grande surface, sous pansement occlusif (imperméable à l'eau et à l'air), sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou une peau de nourrisson, il existe des risques de passage dans la circulation générale.

Utiliser proprement et ne pas garder longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès l'ouverture.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants

Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés. MERCRYL, solution pour application cutanée, peut provoquer des brûlures chimiques cutanées.

Autres médicaments et MERCRYL, solution pour application cutanée

· MERCRYL, solution pour application cutanée ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques, car ensemble ils risquent d'irriter votre peau ou d'être moins efficaces.

· Si vous utilisez du savon, rincez soigneusement avant d'appliquer MERCRYL, solution pour application cutanée.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

MERCRYL, solution pour application cutanée avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

N'appliquez pas MERCRYL, solution pour application cutanée sur les seins pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

MERCRYL, solution pour application cutanée contient {nommer le/les excipient (s)}

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER MERCRYL, solution pour application cutanée ?

MERCRYL, solution pour application cutanée s'utilise 1 ou 2 fois par jour, pendant 7 à 10 jours.

L'application doit durer au moins une minute, pour laisser agir le médicament.

Sur la peau : appliquez MERCRYL, solution pour application cutanée directement sur la plaie avec une compresse stérile.

Sur les muqueuses (génitales) : diluez MERCRYL, solution pour application cutanée avec de l'eau : dans un récipient propre, versez 1 volume de solution, et ajoutez 9 volumes d'eau (soit par exemple 1 cuillère à soupe de solution et 9 cuillères à soupe d'eau).

Puis appliquez la solution diluée sur la plaie.

Attention : la solution diluée doit être préparée juste avant d'être utilisée et ne doit pas être conservée.

NE PAS AVALER

Si vous avez utilisé plus de MERCRYL, solution pour application cutanée que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser MERCRYL, solution pour application cutanée

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser MERCRYL, solution pour application cutanée

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Affections cutanées allergiques telles que dermatite (inflammation de la peau), prurit (démangeaisons), érythème (rougeur de la peau), eczéma, éruption cutanée, urticaire, irritation cutanée et cloques
- Brûlures chimiques chez des nouveau-nés (fréquence inconnue).
- Lésion cornéenne (lésion à la surface de l'il) et lésion oculaire permanente, y compris déficience visuelle permanente (à la suite d'une exposition oculaire accidentelle lors d'interventions chirurgicales sur la tête, le visage et le cou) chez des patients sous anesthésie générale (sommeil sans douleur intense).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MERCRYL, solution pour application cutanée ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-légout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient MERCRYL, solution pour application cutanée

· Les substances actives sont :

Chlorure de benzalkonium.....	0,500 g
Sous forme de solution de chlorure de benzalkonium.....	0,985 g
Digluconate de chlorhexidine.....	0,200 g
Sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine.....	1,065 g

Pour 100 ml.

· Les autres composants sont :

Acide citrique monohydraté, le citrate de sodium, l'eau purifiée.

Qu'est-ce que MERCRYL, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.

Flacon de 125 ml ou 300 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MENARINI FRANCE

1-7, RUE DU JURA

94633 RUNGIS CEDEX

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

MENARINI FRANCE

1-7, RUE DU JURA

94633 RUNGIS CEDEX

Fabricant

LABORATOIRES CHEMINEAU

93 ROUTE DE MONNAIE

37210 VOUVRAY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

{mois AAAA}.

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de IANSM (France).